



DAS HEILENDE MUNDWASSER
HAUT- UND SCHLEIMHAUT DESINFEKTIONSMITTEL 250 ml
GEBRAUCHSANWEISUNG

Was sollen Sie über die SOLUMIUM[®] DENTAL - Lösung wissen?

SOLUMIUM[®] ist eine gelbe, dünnflüssige wässrige Lösung, die ihre Farbe und ihren, an Chlor erinnernden Geruch dem darin enthaltenen hochreinen (hyperrein) Chlordioxid (ClO₂) zu verdanken hat. Andere Komponente enthält sie nicht. Die Lösung kann mit der Haut, mit der Schleimhaut frei in Berührung kommen, aber auf bunte Kleidungsstücke getropft, kann sie diese verfärben. Das Chlordioxid tötet sämtliche krankheitserregenden Mikroben wirksam ab, so auch die Bakterien, die Pilze, die Protozoen und die Viren. Daneben hat es in kleinen Mengen keine schädlichen Wirkungen auf den menschlichen Organismus. Sein Einsatz als Desinfektionsmittel für die Haut und die Schleimhaut wurde bisher dadurch verhindert, dass es in der erforderlichen reinen Form nicht hergestellt werden konnte. In der SOLUMIUM[®] - Lösung ist das Chlordioxid –dank einer neuen ungarischen Erfindung- hyperrein, so ist die Lösung für den obigen Zweck geeignet, und kann über lange Zeit gelagert werden. Eine weitere vorteilhafte Eigenschaft ist, dass das Chlordioxid einige Zehntelmillimeter tief in die Haut und die Schleimhaut eindringen kann, und so desinfiziert es nicht nur die Oberfläche. Das Chlordioxid ist flüchtig, deshalb ist die Flasche nach dem Gebrauch sorgfältig wieder zu schließen, so bleibt die Lösung auch nach dem Öffnen noch lange wirksam. Die Erschöpfung der Lösung wird an der bleichwerdenden Farbe angezeigt. Eine farblose Lösung ist unwirksam. Die Flüchtigkeit des Chlordioxids bedeutet zugleich auch einen Vorteil, denn es verschwindet nach der Behandlung spurlos. Die SOLUMIUM[®] ORAL- Lösung enthält 0,025 % hyperreines Chlordioxid und Wasser.

Wie soll die SOLUMIUM[®] ORAL- Lösung verwendet werden?

Äußerlich zu gebrauchen, nicht verschlucken!

Mundgeruch: ca. 10-fache Verdünnung

Die SOLUMIUM[®] ORAL- Lösung tötet die Bakterien, die den Mundgeruch auslösen ab, und neutralisiert auch die von ihnen erzeugten, unangenehm riechenden Verbindungen. Dazu sollten Sie morgens und abends regelmäßig mit acht- zehnfach verdünnter SOLUMIUM[®] ORAL- Lösung spülen. Zur Verdünnung wird warmes Wasser verwendet. Wenn zum Beispiel zu 10 ml SOLUMIUM[®] ORAL- Lösung 80-90 ml Wasser zugegeben wird, dann können Sie mit dieser Menge einmal fünf-sechs gründliche Spülungen durchführen. Die verdünnte Lösung sollten Sie mindestens 10-15 Sekunden lang im Mund wälzen, und damit auch gurgeln, bevor Sie diese ausspucken würden.

Halsschmerzen: ca. 3-fache Verdünnung

Zur Behandlung einer akuten Rachenentzündung ist eine Chlordioxid-Lösung von grösserer Konzentration erforderlich, deshalb verwenden Sie die Lösung weniger verdünnt. Zu 10-15 ml, eventuell 20 ml SOLUMIUM[®] ORAL- Lösung geben Sie 30 ml warmes Wasser hinzu, und gurgeln Sie damit dreimal hintereinander. Die Zeit eines Gurgelns sollte nach Möglichkeit 10 Sekunden überschreiten. Die, durch die Krankheit hervorgerufenen Schmerzen lassen schon in 5-10 Minuten nach der Behandlung spürbar nach, später

verlöschen sie. Um einen Rückfall der Krankheit zu verhindern, sollte die Behandlung mit Einlegung von 6-10 stündigen Pausen noch zweimal wiederholt werden.

Stockschnupfen: ca. 5-fache Verdünnung

Dies ist eine Begleiterscheinung der auf der Erde am häufigsten vorkommenden Krankheit, des Schnupfens. Verdünnen Sie 10 ml SOLUMIUM[®] ORAL- Lösung mit 40 ml lauwarmem Wasser, und saugen Sie diese erst durch den einen, dann durch den anderen Außennasengang ein bis zweimal durch. Diese Behandlung kann ein leicht scharfes Gefühl auslösen, ähnlich, wie wenn reines Wasser in den Nasengang kommt. Ungefähr 5 Minuten nach der Spülung verbessert sich der Durchgang der Nasengänge, und nach einer halben Stunde wird die Atmung durch die Nase im Allgemeinen ungehindert. Um den Rückfall der Krankheit zu verhindern, ist es zweckmäßig, die Behandlung nach einem halben Tag zu wiederholen. Bei hartnäckiger Infektion kann die Behandlung auch mehrmals wiederholt werden. (Sollte das Aufsaugen durch die Nase unangenehm sein, verwenden Sie das Mittel als Nasentropfen.)

Zahnfleischentzündung: Pinselung, ohne Verdünnung

Das entzündete Zahnfleisch soll mit einer, in SOLUMIUM[®] ORAL- Lösung eingestippten Zahnbürste 3-4 Tage, täglich über 1-2 Minuten bepinselt werden. Gegebenfalls sollen auch die anderen Zahnbürsten mit SOLUMIUM[®] ORAL- Lösung desinfiziert werden.

Pilzinfektionen: Pinselung ohne Verdünnung

Zur Behandlung der Hautpilz-Infektion in der Leistenbeuge, und anderer Hautpilz-Infektionen können Sie die SOLUMIUM[®] ORAL - Lösung zu einer 2 Minuten-Pinselung ohne Verdünnung verwenden. Nach der Pinselung können Sie eine, die Haut beruhigende Creme verwenden. Um einen Rückfall der Fungosität zu verhindern, ist es empfehlenswert, die Behandlung am nächsten Tag zu wiederholen.

Um eine Wiederinfektion zu vermeiden, ist es zweckmäßig, auch die Unterwäsche, die Socken, beziehungsweise andere Kleidungsstücke, die mit dem infizierten Bereich in Berührung kommen, mit der fünffach verdünnten Wasserlösung der SOLUMIUM[®] ORAL zu desinfizieren.

Kleinere Oberhaut-Verletzungen (Streifwunden, Schnittwunden): Anfeuchten der Wundpflaster mit SOLUMIUM[®] ORAL – Lösung

Die betroffene Körperfläche gründlich reinigen, die Feuchtigkeit aufsaugen, und abwarten, bis die Blutung im großen und ganzen aufhört. Danach die Wunde mit einem Wundpflaster abschließen, auf dessen Saugkissen Sie unmittelbar vor dem Gebrauch einige Tropfen SOLUMIUM[®] ORAL – Lösung getropfelt haben. Achten Sie darauf, dass im Kissen nicht zu viel Flüssigkeit vorhanden ist, denn dies würde das Auflegen des Wundpflasters stören. Auch eine, bereits mit Mullbinde abgedeckte Wunde kann desinfiziert werden, indem Sie auf die Mullbinde SOLUMIUM[®] ORAL – Lösung tröpfeln, so, dass diese bis zur Oberfläche der Wunde in die Mullbinde eingesaugt wird. (Die Lösung ist flüchtig, deshalb trocknet sie später von der Binde restlos auf.)

Gebrauch des beiliegenden Meßbechers:

Der beiliegende Meßbecher wird zur Ausmessung der gewünschten Mengen, beziehungsweise zum Erreichen der gewünschten Verdünnung gebraucht. Bei grösseren Mengen können Sie die, mit dem Meßbecher ausgemessene SOLUMIUM[®] ORAL – Lösung und dann das, zur Verdünnung verwendete Wasser in ein größeres Gefäß schütten.

Nebenwirkungen:

Das Präparat hat keine bekannten Nebenwirkungen.

Lagerung:

Die Flasche soll in dunkelen, kühlen Stellen, zum Beispiel im Kühlschrank gelagert werden. Starkem Sonnenschein sollte sie nicht einmal für einige Stunden ausgesetzt werden. Unverzüglich nach dem Gebrauch ist die Haube der Flasche kraftvoll zu schliessen.

Gewährfrist: ein Jahr, von der Herstellung gerechnet. Das Herstellungsdatum ist oben, am Karton angegeben.

Vor Gebrauch kontrollieren Sie die Unversehrtheit der Verpackung.

Achtung: Die Lösung darf mit anderen Desinfektionsmitteln nicht vermischt werden.

Feuergefährlichkeit: „E“ – nicht feuergefährlich.

„S“ – Sätze, die die sichere Verwendung des Präparates betreffen:

S2 Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S13 Es ist von Lebensmitteln, Getränken fernzuhalten.

Ökotoxizität:

Es ist für Wasser-Lebewesen toxisch. Es darf nur in verdünnter Form in das Oberflächengewässer und in das Grundwasser gelangen, so, dass die Konzentration unter 0,8 mg/l bleibt.

Abfallbehandlung:

Das Rest-Desinfektionsmittel kann nach einer 3-4- facher Verdünnung in die Kanalisation geschüttet werden. Die leeren Flaschen können mit Wasser gespült werden.

Herstellung und Vertrieb:

SOLUMIUM Kft., 1118 Budapest, Rozmaring u. 19.

Genehmigungsnummer vom Landes-Sanitätsamt:

OTH 2051-4/2008

Datum der Erstellung des Informationsblattes: November, 2008.

SOLUMIUM® ist eine eingetragene ungarische Schutzmarke.

www.solumium.com